



Action DPC n°12631800004 Session n°1

Questionnaire de 36 QCM à nous retourner impérativement*

Cochez les cases correspondantes à votre réponse.

Plusieurs réponses sont possibles.

Journée de formation SOP du 29 mars 2018 « Prises de décisions pluridisciplinaires »

Question n°1 : Le pronostic du traitement canalaire initial :

- a. ne dépend pas du statut pulpaire
- b. diminue lorsqu'une sensibilité au froid est présente
- c. diminue lorsqu'une LIPOE est présente

Question n°2 : Le potentiel de cicatrisation pulpaire :

- a. est constant tout au long de la vie
- b. est modifié chez les patients jeunes
- c. est modifié chez les patients âgés

Question n°3 : Le principal danger pour la pulpe est :

- a. Une lésion carieuse initiale
- b. Une lésion cervicale non carieuse
- c. Le cumul des agressions

Question n°4 :

La bipulpectomie est indiquée dans le cas de carie profonde car l'inflammation pulpaire est irréversible :

- a. vrai
- b. faux

Question n°5 : Le Matériau de coiffage pulpaire influence

le pronostic du traitement endodontique de préservation de la vitalité pulpaire :

- a. vrai
- b. faux

Question n°6 :

La décision thérapeutique de préserver la vitalité pulpaire ou de procéder à la pulpectomie est encadrée par des critères fiables validés par la littérature :

- a. vrai
- b. faux

Question n°7 :

La conservation de dents parodontalement compromises n'influe pas le niveau osseux des dents adjacentes :

- a. vrai
- b. faux

Question n°8 :

L'avulsion d'une dent parodontalement compromise permet de maintenir le niveau osseux :

- a. vrai
- b. faux

Question n°9 :

Le critère de décision d'extraction le plus important d'une dent parodontalement compromise est :

- a. Le niveau de la perte d'attache
- b. Le degré de mobilité
- c. Le niveau de l'alvéolyse
- d. Le choix du moyen de remplacement de la dent

Question n°10 : Une dent parodontalement compromise présente un pronostic mauvais :

- a. en présence d'une mobilité axiale
- b. en présence d'une perte osseuse supérieure à 75%
- c. en présence d'une lésion inter radiculaire de classe 3

Question n°11 : La décision de conserver ou d'implanter peut être influencée par :

- a. la compliance du patient
- b. la consommation de tabac et l'état systémique
- c. la nature agressive ou chronique de la pathologie parodontale

Question n°12 : Une cavité MOD doit préférentiellement être restaurée par :

- a. un composite bulk fill
- b. un inlay en composite
- c. un inlay en zircone

Question n°13 : Un inlay en céramique doit préférentiellement être réalisé :

- a. en leucite
- b. en feldspathique
- c. en disilicate de lithium

Question n°14 : Après fraisage, la surface dentinaire doit :

- a. être protégée par un inlay provisoire
- b. être protégée par de l'adhésif + un inlay provisoire
- c. être protégée par un composite fluide + un inlay provisoire

Question n°15 : L'épaisseur minimale recommandée pour les inlays en céramique est :

- a. 1mm
- b. 2mm
- c. 3mm

Question n°16 : L'extraction d'une 3^{ème} molaire incluse est recommandée dans les cas :

- a. d'inclusion profonde sans symptomatologie ni pathologie associée
- b. d'encombrement dentaire de la région incisivo-canine
- c. de résorption de la racine distale de la 2^{ème} molaire
- d. de péri coronarite compliquée ou récidivante

Question n°17 : La récurrence d'encombrement dentaire dans la région incisivo-canine :

- a. est due à l'évolution des 3^{èmes} molaires
- b. nécessite systématiquement l'extraction des 3^{èmes} molaires
- c. une germectomie doit être indiquée avant la fin du traitement orthodontique...
...pour prévenir une récurrence
- d. Il n'y a pas d'arguments scientifiques établissant une relation...
...entre l'évolution des 3^{èmes} molaires et un encombrement dentaire

Question n°18 :

L'extraction prophylactique des 3^{èmes} molaires enclavées ou sous-muqueuses est recommandée :

- a. chez les patients à risque infectieux général ou à distance
- b. chez les patients avant radiothérapie cervico-faciale
- c. avant la fin de l'édification radiculaire,
si elle est retenue en position mésio-angulaire ou horizontale
- d. systématiquement après un épisode de péri coronarite

Question n°19 : Quelles sont les situations qui nécessitent l'extraction d'une 3^{ème} molaire :

- a. 3^{ème} molaire incluse en rapport avec un kyste
- b. 3^{ème} molaire sur arcade sans pathologie mais sans antagoniste
- c. 3^{ème} molaire en rapport avec une carie face distale de la 2^{ème} molaire adjacente
- d. 3^{ème} molaire sous-muqueuse située dans une zone...
...d'appui muqueux d'une prothèse adjointe partielle ou complète

Question n°20 : Le laser le plus indiqué actuellement en application parodontale est :

- a. Diode
- b. CO2
- c. Erbium
- d. Nd:YAG

Question n°21 : Quel est la longueur d'onde la plus absorbée par l'eau ?

- a. 2940nm
- b. 10600nm
- c. 980nm
- d. 1064nm

Question n°22 : Quelle affirmation est correcte ?

- a. le laser Erbium:YAG élimine plus de tartre que les ultrasons
- b. dans les cas de parodontite sévère,
l'association laser + ultrasons semble apporter de meilleurs résultats cliniques
- c. le Laser est un outil indispensable dans le traitement parodontal non-chirurgical

Question n°23 : La plupart des rayonnements lasers utilisés en odontologie sont situés dans :

- a. visible
- b. infra-rouge / proche infra-rouge
- c. ultraviolet

Question n°24 : Les dysfonctionnements temporo mandibulaires (DTM) :

- a. peuvent être associés à un bruit articulaire, une algie et/ou une dyscinésie
- b. sont toujours algiques
- c. ont généralement un pronostic bénin

Question n°25 : En présence de DTM douloureux il est recommandé :

- a. d'éduquer le patient sur sa dysfonction
- b. d'éduquer le patient sur son caractère bénin
- c. d'éventuellement associer des médicaments à cette éducation en phase aiguë

Question n°26 : Les gouttières occlusales :

- a. sont significativement plus efficaces que la rééducation musculaire
- b. sont moins efficaces lorsqu'elles sont indiquées tardivement en présence de douleur
- c. peuvent engendrer des effets secondaires

Question n°27 : Les gouttières occlusales :

- a. doivent être en résine acrylique molle
- b. doivent être à recouvrement complet d'une arcade pour limiter les effets secondaires
- c. doivent idéalement être portées durant le sommeil durant environ 2 mois

Question n°28 : La rééducation musculaire :

- a. est un traitement non invasif de première intention de la myalgie
- b. concerne parfois la langue en cas de déglutition dysfonctionnelle
- c. doit être envisagée en cas d'échec d'un traitement par gouttière occlusale

Question n°29 :

Les études scientifiques ont montré la supériorité de la brosse électrique sur la brosse manuelle :

- a. vrai
b. faux

Question n°30 : La brosse électrique permet d'éliminer la plaque interdentaire :

- a. vrai
b. faux

Question n°31 : Sur un parodonte fin, la brosse électrique est contre-indiquée :

- a. vrai
b. faux

Question n°32 : Au cours du traitement orthodontique, la brosse électrique est à éviter :

- a. vrai
b. faux

Question n°33 : Concernant les complications mécaniques des prothèses scellées :

- a. elles sont plus fréquentes dans les données actuelles de la littérature...
...pour les prothèses unitaires que pour les prothèses plurales
b. le taux de complication à 5 ans est d'environ 20% pour les bridges complets
c. le chipping est la complication la plus fréquente

Question n°34 : Concernant les complications techniques des prothèses vissées :

- a. elles sont principalement dues à des dévissages pour les prothèses unitaires
b. le chipping est plus fréquent pour les réhabilitations de grande étendue...
...que pour les prothèses unitaires
c. les dévissages se produisent principalement sur les couronnes unitaires

Question n°35 : Concernant les complications biologiques :

- a. les excès de ciment provoqueraient une inflammation gingivale
b. l'examen radiographique est un bon moyen pour identifier les excès de ciment
c. l'infiltrat inflammatoire est plus faible autour des piliers en zircone que de ceux en titane
d. des profils d'émergence trop marqués favoriseraient les complications

Question n°36 : Concernant les indications et les avantages :

- a. la prothèse scellée serait à éviter chez les patients avec des antécédents parodontaux
b. la prothèse vissée a pour principal avantage d'être démontable
c. la prothèse vissée est une solution plus tolérante par rapport au positionnement implantaire

Merci de nous retourner ce document de préférence par courriel, sinon par courrier à la SOP.

* Dates limites de renvoi : **Qcm ANTE formation : mardi 27 mars 2018**

Qcm POST formation : vendredi 6 avril 2018

Questionnaire ANTE formation

Questionnaire POST formation

Nom : _____ Prénom : _____

Adresse : _____

Code Postal : _____ Ville : _____

Courriel : _____ @ _____

(En caractères lisibles)

N° RPPS (11 chiffres) : _____ N°ADELI (9 chiffres) : _____

(Numéros RPPS et/ou ADELI utilisés lors de la création de votre compte DPC sur le site OGDPC: mondpc.fr)

Mode d'exercice professionnel : libéral salarié

S.O.P. - 6, rue Jean Hugues 75116 Paris - Courriel : dpc@sop.asso.fr